

Aus der Chirurgischen Klinik der Universität Bonn.

Direktor: Prof. Dr. Freiherr von Redwitz.

Anomalien der Handwurzelknochen



INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität
zu Bonn.

Vorgelegt am 9. November 1936

von

Margret Bickel

aus Bonn.

Bonn 1937.
Anton Brand.

Gedruckt

mit Genehmigung der medizinischen Fakultät der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. J a n k e r.

Korreferent: Prof. Dr. Frhr. v. R e d w i t z.



Die Handwurzel des Menschen besteht aus 8 Handwurzelknochen, deren Anordnung zueinander eine distale und eine proximale Reihe erkennen läßt. Die distale Reihe besteht aus dem Os multangulum maius, Os multangulum minus und Os capitatum und Os hamatum; zur proximalen Reihe gehören das Os naviculare, Os lunatum und Os triquetrum mit dem Os pisiforme. Die einzelnen Knochen zeigen eine sehr unregelmäßige Form. Bei allen unterscheidet man eine volare und dorsale Seite, nur das Os pisiforme liegt ausschließlich volar. Die Volarfläche des Os naviculare und des Os multangulum maius haben ein Tuberkulum; diese beiden zusammen bilden die Eminentia carpi radialis. Der Knochenvorsprung am Os pisiforme und der Hamulus ossis hamati geben die Eminentia carpi ulnaris. Zwischen beiden Eminentiae läuft der Sulcus carpi. — Die Handwurzelknochen liegen nicht in einer Ebene, sondern bilden ein dorsalwärts konvexes, volarwärts konkaves Gewölbe. Ihre Verbindung untereinander geschieht durch glatte, überknorpelte Gelenkflächen. Das Os triquetrum ist von der Ulna durch eine Bandscheibe getrennt.

Was die Entwicklung der Handwurzelknochen angeht, so befinden sie sich zur Zeit der Geburt noch ausnahmslos im Knorpelstadium. Das zeitliche Auftreten der Knochenkerne, sowie die Reihenfolge ihrer Erscheinung ist hochgradigem Wechsel unterworfen. Geschlecht, Vererbung und auch Allgemeinerkrankungen wie Rachitis oder Infektionskrankheiten spielen dabei eine Rolle. Nach einer tabellarischen Übersicht von Alban Köhler beginnt die Ossifikation im Os capitatum um die Zeit des 5. Lebensmonats; es folgen das Os hamatum, Os triquetrum, Os lunatum, Os multangulum maius und minus, das Os naviculare bis Ende des 7. Lebensjahres und als letztes das Os pisiforme. Mit Ende des 12. Lebensjahres wäre demnach die Ossifikation vollzogen. — Die Zahl der Knochenkerne beschränkt sich gewöhnlich auf einen einzigen, es sind jedoch fast in allen knorpelig angelegten Handwurzelknochen auch zwei

Knochenkerne gefunden worden. Im Laufe der Entwicklung pflegen diese dann allerdings zusammenzufließen. Störungen in diesen Wachstumsvorgängen können eine Erklärung für die Anomalien geben, die im Bereiche der Handwurzelknochen beobachtet werden.

An erster Stelle im Bereiche der Anomalien der Handwurzel stehen die akzefforischen Handwurzelknochen. Vor ihrer Behandlung soll zunächst gesagt werden, was unter einem akzefforischen Knochen zu verstehen ist. Nach *Thilenius* müssen dazu folgende Bedingungen erfüllt sein:


1. eine hyalinknorpelige Anlage,
2. typische Lagebeziehungen,
3. die Verfolgbarkeit durch die Tierreihe hindurch.

Als rudimentäre Gebilde dokumentieren sie sich einmal durch ihre Neigung, sofort nach ihrer isoliert angelegten hyalinknorpeligen Anlage wieder zugrunde zu gehen. Ferner können sie auf einer erreichten Entwicklungsstufe, losgelöst vom allgemeinen Skelettverbände, persistieren, während die Ausbildung eines richtigen Gelenkes sehr selten ist. Endlich können sie im embryonalen Zustande von benachbarten Skelettstücken assimiliert werden. In Bezug auf ihre Selbstständigkeit sind demnach alle Übergänge von der Assimilation bis zum völligen Verschwinden möglich. Auch *Pfitzner* gibt eine solche Definition; er gibt dabei noch eine Unterscheidung von den Sesambeinen; diese liegen im Gegensatz zu ersteren zwischen zwei anerkannten Skelettstücken, mehr oder minder in deren Kapfel eingeschlossen.


Es war am Ende des vorigen Jahrhunderts, als der Anatom *Pfitzner* seine Beschreibung von 33 akzefforischen Handwurzelknochen veröffentlichte. Für deren große Mehrzahl hatte bereits *Thilenius* hyalinknorpelige Anlagefelder beim Embryo gefunden. Über die phylogenetische Bedeutung dieser Knochen entbrannte aber alsbald ein lebhafter Streit, und mit fortschreitender Entwicklung der Röntgenlehre erfuhr dieser eine wachsende Verschärfung.

Einen Überblick über die von *Pfitzner* gefundenen Knochen gibt seine aus dem *Grashey'schen* Atlas übernommene Skizze.

Dorsal



volar



1. Os Vesalianum. 2. Os capitatum sec. 3. Os Styloideum. 4. Os Parastyloideum. 5. Os Metastyloideum. 6. Os Trapezoides sec. 6a. Os Trapezium. 7. Os Ulnare ext. 8. Os Epipyramis. 9. Os Epilunatum. 10. Os Centrale. 11. Os Radiale ext. 12. Os Epitrapezium. 13. Os Paratrapezium. 14. Os Triangulare. 15. Os Praetrapezium. 16. Os Subcapitatum. 17. Os styloideum hamuli proprium. 18. Os Hypolunatum. 19. Os pisiforme sec. 20. Ossiculum Gruberi. 21. Os Hamulare basale.

Der älteste akzessorische Knochen, der beschrieben worden ist, ist das Os vesalianum. Nach Thilenius sitzt es mit breiter Basis dem Metacarpale V auf; promixalwärts reicht es mit seiner äußersten Spitze eben bis an die vorspringende Ecke des Os hamatum. Bei der Untersuchung seines Röntgenmaterials auf akzessorische Handwurzelknochen hin meint Heimerzheim einen derartigen Körper gefunden zu haben. Er sah nämlich neben dem Os hamatum einen zum Teil die distoulbare Ecke des Mittelhandknochens V überragenden Schatten. Mit Sicherheit wagt er jedoch die akzessorische Natur dieses Knochen nicht zu behaupten, da die nötigen anamnestischen Anhaltspunkte fehlten. Auf einer anderen Aufnahme, die wegen einer Fractura ulnae gemacht worden war, meint Heimerzheim auch, es könne ein Os vesalianum vorliegen. Er sah die distoulbare Ecke des Os hamatum durch einen deutlichen Spalt vom Hamatum abgesetzt. Seiner Genese nach stamme der Knochen von einer atypischen Ossifikation des Os hamatum von zwei Knochenkernen ab. Manche Schwierigkeit ergibt sich bei der Diagnose des Os vesalianum. Auf einem Röntgenbild von Ernst, wo zunächst angenommen worden war, es handle sich um ein typisches Os vesalianum, wurde nachträglich der Beweis erbracht, daß eine nicht verheilte Absprengung am Os metacarpus V vorgelegen hatte. — Wolff sieht im Os vesalianum lediglich die Tuberositas metacarpalis V. — Was seine praktische Bedeutung angeht, so kann das Os vesalianum infolge mechanischer und traumatischer Einflüsse aus dem Verband, den es mit dem Os hamatum hat, herausgerissen werden und damit zu Störungen in dem Gelenk zwischen Metacarpus V und Hamatum führen.

Das Os styloideum wird von Pfitzner in seiner Häufigkeit auf 3—4% geschätzt. Im Atlas von Grashey ist ein assimiliertes Styloid wiedergegeben, und zwar imponiert es als ein Fortsatz an dem im allgemeinen gut abgerundeten Os multangulum minus. „Die Aufhellung des Gelenkspaltes macht dieses Gebilde scheinbar vollständig, man erkennt aber, daß eine obere und untere Verbindungslinie den Gelenkspalt schneiden, weshalb das Knochenstück als assimiliert anzusehen ist.“

Das Os trapezoides sec. ist nach Alban Köhler eine belanglose Varietät, kommt aber seiner Ansicht nach am häufigsten vor. Bei einer kleinen Absprengung proximal kleinfingerwärts an der Basis des Metacarpale I müsse man immer an ein solches denken, zumal wenn das Stück rund sei. Von Rochlin ist an der exartikulierten Hand einer männlichen Leiche zusammen mit anderen Anomalien an der Basis des zweiten Metacarpalknochens ein Os trapezoides sec. festgestellt worden.

Für das Os paratrapezium hat Heimerzheim einen interessanten Fall beschrieben. Es handelt sich um eine 56 Jahre alte Patientin, die sich durch einen Sturz auf die ausgestreckte Hand allen Erscheinungen nach eine isolierte Fraktur des Os multangulum maius zugezogen hatte. Vorausgeschickt werden muß dabei noch, daß die Frau angibt, von Kind an am rechten Handgelenk ein kleines Knötchen gehabt zu haben, das ihr hin und wieder Schmerzen bereitet habe. Auf dem Röntgenbild erkennt Heimerzheim das Bruchstück des Os multangulum maius als einen ziemlich großen Schatten, der die distale Ecke des multangulum maius und die der Basis des Metacarpale I überlagert; von zackigen Bruchlinien ist nichts zu sehen. Das Os multangulum maius zeigt dabei eine Aufhellung, die ungefähr der Größe und Form dieses Schattens entspricht. Nun kommt es bei der ein Jahr später erfolgten Nachkontrolle zu folgender Feststellung: während auf den von verschiedenen Seiten her aufgenommenen Bildern der scharf umschriebene Schatten verloren gegangen ist und damit der Knochen der rechten und linken Hand wieder genau entsprechende Formen zeigen, tritt nun ein neuer Schatten im Bereich der ehemaligen Bruchstelle in Erscheinung. Seiner Form und Lage nach kann dieser Schatten durchaus einem Os paratrapezium entsprechen. Er liegt zwischen Metacarpale und Multangulum maius und wird z. T. von der distoradialen Ecke des Os multangulum maius überlagert. Heimerzheim hält es für falsch, diesen Schatten als den Rest des evtl. reforbierten Bruchstückes ansehen zu wollen, sondern meint, daß das Os paratrapezium vor der knöchernen Ausheilung nur von dem Bruchstück des Multangulum maius überdeckt gewesen wäre. U. a. spricht auch für die

Ansicht, das vor dem Unfall vorhandene Knötchen, dessen Standort genau in die Gegend lokalisiert wurde, wo sich auf den Röntgenbildern der tränenförmige Schatten zeigt. Die bei der Patientin noch nach der Heilung bestehenden Schmerzen werden auch auf das Paratrapezium zurückgeführt. Die Form des Knochens ist einer Träne ähnlich, deren Spitze dem am weitesten nach distoradialwärts vorspringenden Teile des Os multangulum maius zugekehrt ist. Der größte Längendurchmesser beträgt etwas mehr als 7 mm, während der größte Querdurchmesser etwa 4 mm Länge hat. Die abgerundete Basis des Schattens liegt dabei der distoradialen Ecke des Metacarpale I an.

Das Os ulnare externum beschreibt P f i t z n e r als einen im Handrücken gelegenen, dem Triquetrum aufsitzenden Knochen, der vom Triquetrum, Hamatum und Pisiforme begrenzt wird. Wegen seiner Eigenschaft, mit dem Os pisiforme in einem proximal rechts gerichteten Fortsatz desselben verschmelzen zu können, wird es von ihm auch Os pisiforme sec. genannt. Röntgenologisch meint G r u m b a c h, ein solches in zwei Fällen festgestellt zu haben. Die Beobachtungen von H e i m e r z h e i m sind die, daß er zweimal einen Schatten von annähernd kreisrunder Form im Os hamatum gesehen hat, bei dem ihm der Gedanke eines Os ulnare externum nahegekommen ist. Da er aber den vollkommen gleichen Schatten auf einer anderen Röntgenplatte im Os capitatum gesehen hat, wird die Vermutung für ihn damit hinfällig. Eine Abbildung im Atlas von Grashey zeigt einen kleinen Knochen, der seiner Lage nach einem Os ulnare externum entsprechen könnte, da aber das Os hamatum eine deutliche Aushöhlung für dieses Stück erkennen läßt, wird eher angenommen, daß es sich um eine Fraktur handelt.

Das Os epipyramis. Thilenius und Pfitzner haben einen solchen Knochen auf der dorsalen Handfläche zwischen dem Os lunatum, triquetrum und hamatum gefunden. Linienfeld, der ihn ebenfalls gesehen zu haben glaubt, schildert ihn als ein spangenförmiges Gebilde, das sich mit glatter konkaver Fläche eng an das Triquetrum anschließt. Praktisch würde es zu einer Ver-

wechslung mit einer Splitterfraktur des Os lunatum oder auch mit einer Absprennung am Triquetrum zu verwechseln sein.

Das Os epilunatum liegt nach Pfitzner im Handrücken zwischen Os naviculare, Os lunatum und Os capitatum. Das Os hypolunatum liegt an entsprechender Stelle zwischen Naviculare, Lunatum und Capitatum in der Vola manus. Heimerzheim sah einmal auf einer Röntgenplatte im Os capitatum nahe dem Naviculare einen fraglichen Schatten liegen, deutete ihn dann aber doch als Kompakta-Infel im Os capitatum.

Os centrale. Über das Wesen eines Os centrale sind die Meinungen der einzelnen Autoren sehr verschieden. Es liegt nach Angabe derer, die es gefunden haben, zwischen Naviculare, Capitatum und Multangulum minus. Thilenius sah es beim menschlichen Embryo fast immer angelegt. Das Schicksal dieses überzähligen Knochenkernes wäre dann entweder, daß aus ihm ein selbständiges knöchernes Os centrale entsteht, oder daß es in der weiteren Entwicklung spurlos verschwindet. Thilenius hält es auch für möglich, daß eine Assimilation mit dem Os naviculare stattfindet. Pfitzner fügt letzterer Anschauung noch bei, daß auch das assimilierte Stück nichtsdestoweniger zugrunde gehen kann, so daß an der Stelle, wo ein Centrale vermutet wird, eine Lücke gefunden werden kann bzw. eine Auskehrung im Os naviculare. Alban Köhler schildert in bezug auf das Os centrale folgende Verhältnisse: 1. zeigten das Naviculare und das capitatum besonders scharf abgegrenzte Ausschnitte, zwischen denen ein selbständiges knöchernes Centrale lag; 2. am Naviculare befand sich statt des genannten Ausschnitts ein buckelartiger Vorsprung, der genau die Form eines selbständigen Centrale wiederholte; 3. das Naviculare zeigte wieder diesen Ausschnitt, das Os centrale war aber ganz verschwunden bzw. cystisch degeneriert oder auf knorpeliger Stufe stehengeblieben. Letzteres wird von anderer Seite wiederum bestritten. Denn es sei von einer knorpeligen Persistenz des Os centrale in der ganzen anatomischen Literatur nichts zu finden. Diese Tatsache ist auch insofern von Bedeutung, als mit ihr die letzte Anschauung A. Köhlers über das Wesen eines Os centrale zunichte wird. Demnach meint Köh-

ler nämlich aus einer ovalen, sich als Ganzes über das Os naviculare und Os capitatum erstreckenden Aufhellung bei anscheinend normalen Gelenkspalten die Existenz eines knorpeligen Os centrale deuten zu können. Nach der Anschauung anderer kommt dem Röntgenologen eine solche Aufhellung fast täglich zu Gesicht.

Das Os radiale externum kann nach den Forschungen Pfitzners mit dem Naviculare verschmelzen und so die Tuberositas ossis navicularis bilden, kann aber auch mit dem Naviculare in gelenkiger Verbindung stehen. In Grashey's Atlas befindet sich eine Abbildung, wo es sich eventuell um ein Os radiale externum handeln könnte.

Über das Os triangulare herrscht in der Literatur viel Streit, weil die mit diesem Befund häufig kombinierten Abspaltungen von Radius und Ulna die Diagnose erschweren. Thilenius und Pfitzner bezeichnen das Triangulare als ein Homologon zum Os trigonum des Fußes und bezeichnen es deshalb auch mit Intermedium antibrachii. Thilenius sagt auch etwas über das Verhältnis des Knochens an dem anliegenden Miniscus. „Der Knochenkern steht außer Zusammenhang mit der Miniscusanlage, es ist auch kein gegenseitiger Einfluß beider erkennbar. Er liegt zwar proximal vom Gelenkspalt, aber distal vom Miniscus. Eine mögliche Einlagerung in den Miniscus ist immer erst sekundär.“ Pfitzner beschreibt einen Fall von Os triangulare, den er bei einem Erwachsenen einseitig beobachtet hat, folgendermaßen: „Zwischen Processus styloideus ulnae, Radius und Triquetrum sitzt ein plattes, dreieckiges Knochenstück von 13 mm größter Länge und 5 mm größter Dicke. Dem Radius kehrt es eine etwas breitere Kante zu, dem Triquetrum und der Ulna die Flächen.“ Der Processus styloideus ulnae zeigte dabei rechts wie links dieselbe dicke, kurze Form, so daß ein Abriß vom Processus nicht vorgelegen haben kann. — Auch Heimerzheim ist von der Existenz eines echten Os triangulare überzeugt. Aus seinem Röntgenmaterial stammen folgende Fälle. Bei dem einen handelt es sich um einen 59 Jahre alten Mann, der wegen einer leichten Quetschung der linken Hand zur Untersuchung gekommen war. Neben einer Fraktur der Mittelphalange IV

und V sah man auf der Platte einen etwa 11 mm langen und 6 mm breiten Knochen Schatten, der sich vom Processus styloideus ulnae, der auch bei seitlicher Aufnahme keinen Defekt aufwies, zwischen Ulna und Triquetrum zum Lunatum hinüberzog. Der Patient hatte angegeben, nie ein Trauma vorher erlitten zu haben. Bei dem anderen Fall handelt es sich um die Aufnahme der Hand eines Mannes, der wegen unbestimmter Beschwerden in der Handwurzel gekommen war. Es ließ sich keinerlei Anzeichen einer stattgehabten Fraktur auf dem Bild erkennen, lediglich zeigte sich ein kleiner, rundlicher Schatten zwischen Ulna und Os lunatum. Was die Genese des Knochens angeht, beruft sich Heimerzheim zunächst auf Merkel, nach welchem am Ende des 5. bzw. zu Anfang des 6. Lebensjahres im distalen Ende der Ulna ein Knochenkern entsteht, der um die Zeit des 14. Lebensjahres in den Processus styloideus ulnae vorrücke. Es bestehe aber außerdem auch die Möglichkeit, daß der Processus styloideus einen eigenen Epiphyse kern besitze. In diesem kann es nach Heimerzheims Anschauung zu Ossifikationsstörungen kommen, deren Folgen dann unter Umständen ein Selbständigbleiben des Epiphyse kernes und somit ein echtes Os triangulare sind. — Ferner sei auch das Ergebnis angeführt, zu dem Fischer bei seinen Untersuchungen am Processus styloideus ulnae gekommen ist. Abgesehen von 3 Fällen, wo seiner Ansicht nach echte Ossa triangularia vorgelegen haben, sah Fischer viermal gichtische Veränderungen, die sich das eine Mal beiderseits dem Processus wie eine Kappe auflagerten. Außerdem beobachtete er Abrisse vom Processus styloideus, die sicher vergrößert waren und nicht mehr die Form eines Fragmentes zeigten, sondern gut abgerundet waren; er führt auch ein Beispiel einer 51jährigen Frau an, die eine seit 2 Jahren bestehende Radiusfraktur hatte. Der Processus sah fast normal aus, das abgerissene Stück war vergrößert und rund. Bei der letzten Gruppe fand er Abrisse des Processus mit Pseudarthrose des z. T. sehr vergrößerten Fragmentes. Davon führt er vier Beispiele an. Aus diesen Fällen, wo ein Abriß des Proc. styloideus vorlag, gewinnt er für die Genese des Os triangulare folgende Gesichtspunkte: Die Tatsache, daß bei

ausbleibender Verheilung des Abrisses dieses Stück das eine Mal noch nach Jahren seinen Charakter als Fragment erkennen läßt, und auch am Processus die Frakturstelle erhalten bleibt, während in seltenen Fällen Pseudarthrosenbildung und Vergrößerung des Bruchstückes eintreten, läßt ihn vermuten, daß das Trauma in den seltenen Fällen einen Processus betroffen hatte, der die knorpelige Anlage eines Triangulare affiniert hatte. Dieser nicht zur Verwertung gelangte Keim könne infolge des durch das Trauma gesetztes Reizes noch jetzt eine besondere Ausbildung erfahren, und so zu einem selbständigen Wachstum des Fragmentes führen. Die Verhältnisse würden denen entsprechen, wie man sie bei Patellarfrakturen gelegentlich beobachtet. — Die Fälle, wo nach F i s c h e r ein Os triangulare vorgelegen hatte, waren 1. eine 36jährige Frau. Vor 15 Monaten hatte sie ein Trauma erlitten; eine Radiusfraktur war nicht nachweisbar. Der Processus war gut entwickelt, radial von ihm lag ein typisch geformtes Triangulare mit einer gegen das Triquetrum gerichteten Gelenkfläche. Bei einem anderen Fall einer 32jährigen Frau war kein Trauma vorausgegangen. Auf der Seite, wo sich das Triangulare befand, war der Processus styloideus kurz und dick. Gegen das Triquetrum zeigte der Knochen eine Gleitfläche; mit dem Processus stand er in gelenkiger Verbindung. An der anderen Hand war der Processus groß, etwas einwärts gebogen und von einem Os triangulare war nichts zu sehen. Diesem entspricht vollständig noch ein drittes Bild von einem 35jährigen Mann, wo auch kein Trauma in der Anamnese vorgelegen haben soll. —

Zu weiteren Resultaten führen die von Grumbach untersuchten Handröntgenogramme. Danach war unter 800 Bildern kein einziges Triangulare zu finden. Er meint auch, die von P f i t z n e r beobachteten Fälle seien ausnahmslos als Abiprengungen von Seiten des Radius und der Ulna anzusehen.

Wie die Differentialdiagnose eines akzessorischen Handwurzelknochens von einem Knochenabritt schwer zu stellen sein kann, zeigt das Os styloideum hamuli prop. Bei diesem muß man immer an einen Abritt des Hamulus vom Os hamatum denken, wie er

vereinzelte in der Literatur beschrieben worden ist. So berichtet Deimel über einen Fall, wobei der Hakenfortsatz in die Gegend der Basis des Metacarpus V verlagert war. Matti erwähnt in seinem Lehrbuch „Die Knochenbrüche und ihre Behandlung“ zwei Fälle, wo es sich bei dem einen um einen Abbruch des Hakenfortsatzes mit Verschiebung medialwärts zum Capitatum handelte; bei dem anderen Fall war die Basis des IV. und V. Mittelhandknochens gebrochen und als Fragment des IV. Mittelhandknochens mit dem Hakenbeinkörper dorsalfwärts luxiert.

Unter den Anomalien ist das Problem des Os naviculare bipartitum wohl am häufigsten erörtert worden. Es kann bei ihm zwei- und mehrfache, voll- und unvollständige Teilung vorkommen. Die Beobachtungen, die Pfitzner in Bezug hierauf gemacht hat, sind folgende: Pfitzner hat unter etwa 1500 von ihm untersuchten Händen in 9 Fällen eine vollständige und in weiteren 31 Fällen eine unvollständige Teilung des Os naviculare beobachtet. Einen Fall von angeborenem Os naviculare bipartitum bringt Heimerzhelm. Er hat ein geteiltes Naviculare bei einem Patienten gefunden, der wegen einer frischen Radiusfraktur aufgenommen worden war. Auf dem Röntgenbild ist hier neben der Radiusfraktur und neben einer Abspaltung des Processus styloideus ulnae ein zweigeteiltes Naviculare zu erkennen. Es sei nun ohne weiteres ersichtlich, daß das jüngste Trauma in keinerlei Beziehung zu dem vorhandenen Naviculare bipartitum stehe. Es war nämlich auch klinisch keinerlei Druckschmerzhaftigkeit des Naviculare festzustellen¹⁾. — Bei weitem häufiger ist die Auslegung des Os naviculare bipartitum als Folge einer Fraktur und damit einhergehender Pseudarthrosenbildung. So handelt es sich nach den Untersuchungen von Wolff bei den von Pfitzner beobachteten Navicularia bi- et tripartita um die Produkte von Navicularfrakturen. Auch Markus Marcellus bemerkt hierzu in seiner jüngst erschienenen Abhandlung über die Navicularfraktur als Sportverletzung, daß die

1) Die Möglichkeit evtl. vor diesem Unfall schon früher ein Trauma erlitten zu haben, wird vom Patienten abgelehnt.

alte Ansicht der Anatomen über eine Zweiteilung des Os naviculare zugunsten der Annahme von Pseudarthrosenbildung weichen müsse; sein Material beläuft sich auf 7 Fälle. Bei einem Fall von Wette lautet seine diesbezügliche Anschauung: „Es folgt daraus trotz anfänglicher Zweifel, daß auch an unserem Material jedes Naviculare bipartitum nichts weiter ist als eine traumatische Pseudarthrose.“

Aus Gefagtem ergibt sich, wie gering die Zahl der sicher als akzessorisch anerkannten Knochenteile ist. Nach der Anschauung von Grumbach gehören dazu lediglich das Os centrale, das Os styloid, Os pisiforme sec., das Os ulnare ext. und das Os trapezoides. Max Ernst meint unter 6000 Handröntgenogrammen nicht einen einzigen, sicher nicht traumatisch entstandenen akzessorischen Knochen gefunden zu haben. — Bei der Deutung der Röntgenbilder sind eine ganze Reihe differentialdiagnostischer Schwierigkeiten zu beachten. An erster Stelle stehen hier die Frakturen und Pseudarthrosenbildungen. Gelegentlich sind in einzelnen Knochen Kompakta-Inseln vorhanden, man erkennt sie als mehr oder weniger scharf gegen die Umgebung abgesetzte Inseln innerhalb der spongiosen Architektur. In den Weichteilen kann es infolge von Gelenkerkrankungen zu pathologischen Gewebseinlagerungen kommen. Schwierigkeiten können Kapselverkalkungen machen, die nur aus dem Verhalten der übrigen Knochen zu erkennen sind, wenn gleichzeitig arthritische Veränderungen damit verbunden sind, so spricht das mehr für einen akzessorischen Knochen bzw. für eine Abspaltung. Arteriosklerotische Herde sowie Venensteine können auch Schwierigkeiten machen.

Neben den beschriebenen akzessorischen Handwurzelknochen können Abweichungen vom normalen Handwurzel skelett auch hervorgerufen sein durch eine Zahlenverminderung der Handwurzelknochen bei Verschmelzung sonst selbständiger Knochen. Bereits Pfitzner hat auf eine Reihe anatomisch beobachteter Synostosen hingewiesen. Ihrer Genese nach sind auch sie nicht immer eindeutiger Natur. Man muß bei ihnen darauf achten, ob wirklich angeborene Mißbildungen vorliegen, oder ob es sich nur um

die Folgen von Zerstörung der Handwurzelknochen durch Traumen oder entzündliche Prozesse handelt. Ferner könnten intrauterine Einflüsse im Spiele sein oder in Analogie zu den Beobachtungen an den Fußwurzelknochen die Folgen einer veränderten Belastungsart vorliegen.

Angeborene Synostosen der Handwurzelknochen treten einseitig oder doppelseitig, allein oder mit anderen Skelettverbildungen kombiniert auf. Meist sind dabei nur zwei Knochen betroffen. Die Verschmelzung dreier oder mehrerer Elemente ist selten. A. K ö h - l e r führt folgende Kombinationsmöglichkeiten an: Os lunatum und Os triquetrum, Os trapezoides und Os naviculare, Os multangulum minus und Os capitatum, Os capitatum und Os hamatum, sowie Os capitatum und Metacarpalis III. Am häufigsten scheint in der Literatur die Lunatum-Triquetrum-Synostose beschrieben zu werden. U. a. berichtet S o r o k i n über eine solche vollkommene Verschmelzung bei einer seit 5 Jahren tätigen Schneiderin, welche seit Jahren nach längerer Arbeit Schmerzen im Handgelenk bekam. Abgesehen davon fand man keine Anomalien an ihr, auch nicht an Händen und Füßen ihrer Geschwister und ihrer Tochter. Einen anderen Fall bringt K r e m f e r; es handelt sich dabei um die Röntgenbilder eines 17jährigen Jungen, der wegen Verletzung des rechten Handgelenks eingewiesen worden war, und wo sich dann als Nebenbefund an beiden Händen eine Synostose zwischen Triquetrum und Lunatum herausstellte. Der Junge hatte als Kind eine Rachitis durchgemacht, aber doch war in diesem Falle diese nicht als Ursache der Verschmelzung anzusehen, sondern K r e m f e r hält es für eine angeborene Bildungsanomalie. — Einen Fall von teilweiser Verschmelzung zwischen Os lunatum und Os triquetrum beschreibt E p s t e i n: An der Stelle des Os lunatum und Os triquetrum der rechten Hand befand sich da ein Knochen, der anscheinend aus beiden zusammen bestand. In sagittaler Richtung dieses Knochens lag ein an der distalen Gelenkfläche beginnender, etwa $\frac{1}{3}$ der Dicke des Knochens durchsetzender Spalt, der glatte Ränder hatte und sich rund in die distale Gelenkfläche öffnete. Die proximale Gelenkfläche war ununterbrochen

und zeigte an der Stelle, wo am Kontrollbild das Os lunatum und Os triquetrum geteilt war, keine Trennungslinie. Es konnte nicht entschieden werden, ob diese Spaltung angeboren oder erst nach dem Trauma entstanden war. Aber die vollkommene Glätte der Ränder sprach mehr für eine angeborene teilweise Trennung. — J. Mestern hat diese Synostose unter einer ganzen Reihe anderer Verschmelzungsformen an zwei Familien beobachtet, die außerdem beide Aplasien der Interphalangealgelenke zeigten. Es wird in der Literatur übrigens immer wieder erwähnt, daß Mißbildungen in den Carpalknochen häufig mit Mißbildungen am übrigen Handgelenk verbunden sind. Bei der einen Familie O. zeigte der 12jährige Sohn an beiden Händen eine vollkommene Lunatum-Triquetrum-Verschmelzung und außerdem noch eine Synostose zwischen Multangulum maius und Metacarpale I, sowie eine Verschmelzungsbrücke zwischen Multangulum minus und Capitatum. An den Füßen des Patienten waren keine Anomalien zu finden. In der anderen Familie zeigte die Mutter eine Lunatum-Triquetrum-Synostose ebenfalls an beiden Händen und außerdem noch eine Verschmelzung zwischen Multangulum minus und Capitatum. An den Füßen der Patientin waren zahlreiche Anomalien. Bei der Tochter lag eine doppelseitige Lunatum-Triquetrum-Synostose vor und gleichzeitig waren Multangulum maius und Naviculare verschmolzen. Mit diesen Befunden hat J. Mestern zum ersten Mal den sicheren Nachweis erbracht, daß es sich bei den Verschmelzungen um ein heredofamiliäres Vorkommen handeln kann, die Erbllichkeit dieser Synostosen also sichergestellt ist. Aus seinen Beobachtungen entnimmt er folgende Anschauung für die Erblehre: Für die normale Ausgliederung der Handwurzel ist ein Gen verantwortlich zu machen, das bei Auftreten irgendwelcher Synostoseformen eine Störung erlitten haben muß. Es ist demnach nicht die einzelne Synostosenform vererblich, sondern die allgemein zur Synostose führende Störung. Die jeweils auftretende Kombination kann innerhalb einer Familie variieren, eine Gesetzmäßigkeit läßt sich dabei nicht aufstellen. Es gibt ferner den Anschein, daß dieses Gen

sich leicht mit dem Gen koppelt, das für die Fingergelenksbildung verantwortlich ist.

Eine Synostose von Os triquetrum und os hamatum beiderseits vereinbart mit einer Synostose des Os capitatum und Os hamatum lediglich an der rechten Hand, zeigt ebenfalls die von Meßtern beschriebene Familie O. Betroffen war die 7 Jahre alte Tochter. Der Befund gibt übrigens ein Beispiel für die immerhin seltene Erscheinung, daß sogar drei nebeneinander liegende Kerne miteinander verschmelzen können. Auf dem Bild des 5 Jahre alten Sohnes waren ebenfalls an beiden Händen das Os hamatum mit dem Os triquetrum verschmolzen.

Auf beiden Bildern waren an den Synostosen tiefe Einkerbungslinien zu erkennen. Aus dieser Tatsache, meint Meßtern, könnte man für die Entwicklung der Synostosen entnehmen, daß die Kerne der einzelnen Knochen schon in einem verhältnismäßig frühen Entwicklungsalter verschmolzen sind. Damit ist aber nicht geklärt, ob sie zunächst getrennt angelegt werden und später verschmelzen, oder ob sie einem gemeinsamen, schon in der knorpeligen Anlage zusammenhängenden Komplex entstammen. In diesem Falle, wo die Gebilde durch die eingeschnittenen Kerben wirklich wie aus einzelnen Teilen zusammengesetzt aussehen, neigt Meßtern zu der Ansicht, daß sie zunächst getrennt angelegt sind. In Analogie zu den Aplasien der Interphalangealgelenke, deren Entwicklung er röntgenologisch genauer verfolgt hat, nimmt er an, daß es sich auch bei den Handwurzelknochen um Hemmungsmißbildungen der Gelenkräume handelt. Wenn diese auf einer primitiven Stufe, während welcher der Gelenksraum noch mit embryonalem Bindegewebe erfüllt ist, stehen bleiben, so findet die periphere Ossifikation der Knochen keinen Abschluß, und überwuchert die ihr andernfalls gesetzte Grenze. Damit kommt es dann zur Verschmelzung.

Eine weitere Synostose von Os capitatum und Os hamatum an beiden Händen ist von Linow beschrieben worden. Er machte diese Beobachtung bei einem sonst gefunden und normal gebauten 30jährigen Molkereiangestellten, bei dem beide Hände wegen einer

erlittenen, aber folgenlos gebliebenen Handverstauchung geröntgt worden waren. — Bei einem Fall, den *P o l i t z e r* schildert, bestand beiderseits ein knöcherner Zusammenhang des *Os hamatum* und *Os capitatum* einerseits und des *Os lunatum* und *Os triquetrum* andererseits. Die Stelle, an welcher sich die Gelenke befinden sollten, war durch schmale feichte Einziehungen an der Knochenoberfläche stellenweise erkennbar.

Die Synostose zwischen *Os multangulum minus* und *Os capitatum* ist nach *P f i t z n e r* eine sehr seltene Verschmelzungsform. Abgesehen von dem bei *M e s t e r n* geschilderten Fall, wo eine Verschmelzung zwischen *Os multangulum minus* und *Os capitatum* und *Os hamatum* vorgelegen hat — nebenbei gesagt eine ebenfalls ausgesprochen seltene Blockbildung —, schildert auch *Wette* einen Befund. Bei diesem zeigte das Röntgenbild eine unvollkommene Verschmelzung zwischen *Os multangulum minus* und *capitatum*, die seiner Ansicht nach zweifellos eine angeborene Mißbildung war. Beschwerden oder funktionelle Ausfallerscheinungen sind nicht beobachtet worden.

Neben der von *M e s t e r n* gefundenen Synostose zwischen *Naviculare* und *Multangulum maius*, sei auch eine von *K a u t z* beobachtete angeführt. In seinem Falle war es ein Patient, der wegen einer erlittenen Handverstauchung geröntgt worden war, und bei dem sich dann auf beiden Händen eine solche Verschmelzung herausstellte. Bewegungsstörungen der Handgelenke bestanden nicht, lediglich war die Rückwärtsbewegung gleichmäßig auf beiden Seiten nicht so ausgiebig wie gewöhnlich. — Es sei noch ein Fall von *M o r e a u* erwähnt, bei dem die gleiche Verbildung bei einer Spalthand zu sehen war.

In Verbindung mit anderen Anomalien ist eine Synostose zwischen *Multangulum maius* und *Metacarpale I* von *R o c h l i n* gefunden worden. Es handelte sich um ein 11 Jahre altes Mädchen mit congenitaler Gelenkshypoplasie, wo außer der Verknöcherung zwischen *Os multangulum maius* und der Epiphyse des I. Metacarpalknochens eine Assimilation der Mittelphalangen am 4. und 5. Finger, sowie eine Verengerung des proximalen Interphalangeal-

raumes am 3. Finger bestand. Die linke Hand des Mädchens zeigte fast dieselben Erscheinungen. — Verschmelzungen von Os metacarpale III und Os capitatum, Os capitatum und Os naviculare, sowie von Os multangulum maius und minus sind noch von R u c k e n s t e i n e r erwähnt worden.

Zu den Verschmelzungsformen, bei denen mehr als zwei Knochen beteiligt waren, sei noch hinzugefügt, daß auch ein Carpus aus einem einzigen Stück beobachtet worden ist (von Laquerrière und Loubier). Alle Carpalknochen waren in dem Falle untereinander verschmolzen und außerdem war die Gelenkspalte zwischen Carpus und Metacarpalknochen aufgehoben. Der Befund wurde für congenital gehalten. — Ferner ist auch eine Hand mit einer einzigen Reihe von Carpalknochen beschrieben worden (L'Heureux). Es handelte sich um eine Verschmelzung zwischen Os lunatum, Os triquetrum und Os hamatum, ferner zwischen Os capitatum und Os naviculare, sowie zwischen Os multangulum maius und Multangulum minus. Die Funktion war vollkommen erhalten geblieben. Der Beweis aber, daß sicher keine traumatische Genese zugrunde gelegen hat, wurde nicht erbracht.

Die schließlich noch zu erwähnende Anomalie der Handwurzelknochen ist die angeborene Hypoplasie der einzelnen Carpalknochen. Sie ist meist mit anderen Anomalien der Hand vergesellschaftet. E s a u berichtet von einem Patienten, bei dem das Os multangulum fehlte, während die erste Reihe der Handwurzelknochen vollzählig zu erkennen gewesen war. Außerdem war bei dem Patienten eine Dreifingrigkeit vorhanden. Bei einer Beschreibung von W. M ü l l e r war das Os multangulum maius kleiner als das multangulum minus; es erschien als ein kaum kirschgroßer rundlicher Schatten. Außerdem war auf der rechten Seite ein kleiner rundlicher Schatten von etwa 2 mm Durchmesser und auf der linken Seite ein noch kleinerer von nur 1 mm Durchmesser zu sehen, beide inmitten einer entsprechenden knochenfreien Lücke liegend. Die Verhältnisse beim Naviculare waren ähnlich. Es handelte sich hier also um einen Fall, wo das Os multangulum maius noch relativ am wenigsten in seiner Entwicklung zurückgeblieben

war, das Os lunatum und Naviculare aber nur als kleine Knochenkerne vorhanden waren. — Andere isolierte Defekte von Handwurzelknochen beschreiben Eaves und Campiche. Die linke Hand zeigte hier ein Os naviculare von nur halber Größe und Fehlen des Processus styloideus radii und rechts völliges Fehlen des Os naviculare bei sehr schwacher Entwicklung eines Processus styloideus radii. — L. Hoffmann macht folgende Beobachtung: An der rechten Hand war eine starke Verkleinerung des Os multangulum maius vorhanden; das Os naviculare und Os lunatum fehlten vollkommen. An der linken Hand war das Multangulum minus stark verkleinert und gar nicht recht neben dem Os multangulum maius zu erkennen. Das Os naviculare und Os lunatum fehlten auch hier vollkommen. Nach den wenigen Beobachtungen hat es den Anschein, als ob einzelne Carpalia eine gewisse Disposition zu derartigen Mißbildungen zeigen; das Os naviculare und das Os lunatum sind am häufigsten betroffen.

An der hiesigen Klinik ergab die Durchsicht von 1520 Handröntgenogramme folgendes Resultat: Von akzessorischen Handwurzelknochen fanden sich einige Beispiele für das Os triangulare. Bei dem einen Bild handelte es sich um einen 32 Jahre alten Schlosser, dessen linke Hand wegen einer Radiusfraktur geröntgt worden war. Als Nebebefund zeigte sich hier ein ungefähr 6 mm großer dreieckiger Knochenschatten im Bereich des Processus styloideus, der diesen zum Teil überdeckte. Die Struktur des Knochens zeigte keine Besonderheiten. Auffallend war, daß der Processus styloideus an dieser Hand bedeutend größer war als an der rechten Hand. Mit seiner dreieckigen Spitze war er nach dem Os triquetrum hin gerichtet. An der rechten Hand war der Processus klein und flach abgerundet. Da in der Vorgeschichte nichts von einem Trauma zu erfahren war, und röntgenologisch keinerlei Zeichen eines alten Traumas zu finden war, kann man diesen überzähligen Knochen wohl als Os triangulare deuten.

Bei einer anderen Aufnahme, die anlässlich einer frischen Radiusfraktur gemacht wurde, kann auch nur die Annahme eines Os triangulare den am Processus styloideus gelegenen überzähligen

Knochen Schatten erklären. Es handelt sich dabei um einen etwa 4 bis 6 mm langen Schatten, der wie eine Verlängerung des Processus styloideus ausieht. Der Processus zeigt aber glatt abgerundete Konturen. Sonst ist an den Handwurzelknochen keine Auffälligkeit zu bemerken.

Ein anderes Röntgenbild, wo es sich um den Zustand einer alten Navicularfraktur handelt, zeigt einen Processus styloideus, der an seiner radialen Seite von einem im Durchmesser ungefähr 6—10 mm großen Knochen Schatten teilweise überdeckt ist. Das Gebilde lagert sich mit seiner ausgezogenen Spitze dem Os triquetrum an. Seine Struktur zeigt in der Mitte einen Kern, an den sich ein hellerer Hof anschließt, der außen von einem Kalkmantel umgeben ist. Welcher Genese dieser Knochen ist, läßt sich nicht feststellen, aber es wird sich dabei kaum um eine Absprennung vom Griffelfortsatz handeln. Mithin ist die Annahme eines Os triangulare als wahrscheinlich anzusehen.

Bei einem letzten Fall muß offen gelassen werden, ob der Befund als Os triangulare zu deuten ist, oder ob es sich um eine alte pseudarthrotisch gewordene Absprennung vom Processus styloideus handelt. Das Röntgenbild zeigt hier eine Radiusfraktur der linken Hand; an der dem Radius zugekehrten Seite des kräftig entwickelten Processus styloideus befindet sich ein dreieckiger Knochen Schatten. Er lagert sich dem Processus dicht an, ist von ihm aber durch einen feinen Spalt getrennt. Bei genauer Beobachtung erscheinen die Knochenlinien des Spaltes, vor allem die des Knochenstückes, nicht ganz glatt, so daß man fast eher an eine Absprennung denken möchte. Leider fand sich keine Vergleichsaufnahme der anderen Hand. Es ließ sich auch nichts in Bezug auf eine früher stattgehabte Fraktur ergründen.

Eine ausgesprochene Mannigfaltigkeit der Erscheinungen zeigte sich in dem Bereich des Os centrale. Die von A. K ö h l e r beschriebene, sich als Ganzes über das Os capitatum erstreckende Aufhellung war so häufig zu finden, daß man in ihrer Deutung mehr der Anschauung der Autoren beipflichten möchte, die darin nicht das Vorhandensein eines Os centrale erkennen, sondern einen an-

ders zu deutenden Nebenbefund.

In noch weiteren Röntgenbildern, in denen die Annahme eines akzefforischen Knochens in Frage stand, erwies sich diese als unberechtigt, da in der Vorgeschichte ein Trauma nachgewiesen werden konnte.

Hiermit sind die Fälle, bei denen akzefforische Knochen vorliegen, besprochen und das Röntgenmaterial ergab nur noch eine weitere Anomalie, eine Mißbildung bei einem 35 Jahre alten Patienten. An seiner linken Hand sind lediglich der 1., 2. und 3. Finger ausgebildet; an den Handwurzelknochen liegt eine Verschmelzung des Os lunatum und Os triquetrum vor, zwischen beiden befindet sich an der distalen Seite eine Einkerbung. Das Os naviculare zeigt eine ausgesprochene Hypoplasie, während die anderen Handwurzelknochen in ihrer normalen Form vorhanden sind.

Literatur-Verzeichnis.

- Behr: Über eine symmetrische Synostose der Hand- und Fußwurzelknochen. Arch. f. orthop. u. Unfall-Chir. 1931, Bd. 32.
- Eaves u. Campiche: Note on a malformation of the carpus. Ref. Zentralorgan f. Chir. Bd. 17, S. 475.
- Epstein: Ein Fall von angebl. Anomalie der Handwurzelknochen. Arch. orthop. Chir. 27.
- Ernst und Römmelt: Über Abspaltungen an den Handwurzelknochen. D.Z. f. Chir. Bd. 241.
- Esau: Angeborene Synostosen im Bereich des Carpus und Tarsus. Rö. Prax. V, 1933.
- Fischer: Beitrag zur Kenntnis der Skelettvarietäten (überzählige Carpalia und Tarsalia, Sefambeine und Compacta-Inseln). Fortschr. Bd. 19, 1912.
- Grashey: Atlas typischer Röntgenbilder.
- Heimerzheim: Über einige akzessorische Handwurzelknochen nebst ihrer chirurgischen Bedeutung. D.Z. f. Chir. 190, H. 1—2.
- Ein Fall von Os paratrapezium, gleichzeitig ein Beitrag zur Lehre von den isolierten Frakturen des Os multang. maius. D.Z. f. Chir. 186.
- Hoffmann: Mißbildungen der oberen Extremitäten. Fortschr. Bd. 17, 1911.
- Kautz: Angeborene und erworbene Synostosen der Handwurzelknochen. D.M.W. 1930 II.
- Köhler: Grenzen des Normalen und Anfänge des Pathologischen im Röntgenbild.
- Kremser: Über eine angeborene Synostose der Handwurzelknochen. Rö. Prax. IV.
- Lilienfeld: Die Carpalia und ihre Beziehungen zu den Brüchen der Handwurzel und der Mittelhandknochen. Fortschr. Bd. 13.
- Linow: Beiderseitige Verschmelzung des Kopf- und Hakenbeins. Rö. Prax. IV.
- Marcellus: Die Navicularfraktur der Hand als Sportverletzung. Zbl. f. Rad. Bd. 19, H. 3, 1935.
- Mestern: Erbliche Synostosen der Hand- und Fußwurzelknochen, erbliches Os tibiale ext. Rö. Prax. VI, H. 9.
- Müller: Ein Beitrag zu den angeborenen Mißbildungen der Karpalknochen. Arch. f. Orthop. u. Unfall-Chir. Bd. 22.
- Pfitzner: Die Sefambeine des Menschen. Morph. Arb. B. I. H. 4.

- Beiträge zur Kenntnis des menschlichen Extremitätenskeletts. Die Variationen im Aufbau des Hand skeletts. Morph. Arb. 1895. Bd. IV.
- Die morphol. Elemente des menschlichen Hand skeletts. Morph. Arb. Bd. II.

Politzer: Über Mißbildungen des Hand- und Fußskeletts. Fortschr. Röntg. 43.

Rochlin: Fortschr. Röntg. 46.

Ruckensteiner: Die normale Entwicklung des Knochen systems im Röntgenbild.

Sorokin: Rö. Prax. V.

Thilenius: Über accessor. Elemente. Morph. Arb. 1896. Bd. V.

Wette: Verletzungen und Anomalien im Bereich der Handwurzel. Arch. orthop. Chir. 29.

Wolff: Die Erfahrungen über Handwurzelverletzungen, verglichen mit den Ergebnissen der Varietätenstatistik an den Knochen der Handwurzel. D.Z. f. Chir. Bd. 70.

Lebenslauf.

Am 27. September 1908 wurde ich, Margret Bickel, in Greifswald als Tochter des Univ.-Professors Ernst Bickel und seiner Frau Berly geb. Braadland aus Stavanger geboren. Ich bin rein arischer Abstammung.

Meine Schulzeit verbrachte ich bis zum 13. Lebensjahr in Kiel, kam dann nach Königsberg, wo ich 1928 auf der realgymnasialen Abteilung der Königin-Luise-Schule das Abitur machte. Meine vor-klinischen Semester verbrachte ich in Kiel und Bonn und machte im Herbst 1931 die ärztliche Vorprüfung in Bonn. Die weitere Studienzeit verbrachte ich an den Kliniken in München und Bonn, wo ich am 27. Januar 1936 die ärztliche Prüfung bestand. Während meiner Med.-Prakt.-Zeit war ich sieben Monate in Berlin an der I. Med. Klinik der Charité tätig.
